

## Paprika, blockig, Gewächshaus: Anbau- und Sortenhinweise 2007, (*Capsicum annuum*)

End-standort	Anzucht			Pflanzung		Ernte- beginn:  Datum	Haupt-Sorten							
	Saat	Methode	Tage	Datum	Tage		grün - rot				grün - orange		grün - gelb	
GH temperiert	15.12.	ET/SW	65	20.02.	45	04.04.			Yecla	Ferrari		Rubato		
GH temperiert	25.01.	ET/SW	53	20.03.	31	20.04.			Yecla	Ferrari		Rubato		
GH kalt	05.03.	ET	56	01.05.	56	25.06.	Bendigo	Bontempi	Yecla	Ferrari	President	Rubato	Fiesta	Luteus
GH kalt	05.04.	ET	55	01.06.	52	21.07	Bendigo	Bontempi	Yecla	Ferrari	President	Rubato	Fiesta	Luteus

Paprika

**Saatgutangebot:**

Normalsaatgut, Präzisionssaatgut ( z.T. mit Vorbehandlung )

**Saatgut:**

TKG 6 - 8 g, 1 g = 120 - 170 Korn, 1 g = 60 - 70 gute Sämlinge, Mindestkeimfähigkeit 65 %, etwa 3 - 4 Jahre keimfähig

**Pflanzdichte:**Bei Steinwolle 3 Pflanzen / m<sup>2</sup> mit 6 Trieben / m<sup>2</sup> an Schnüren hoch geleitet, strenger Schnitt auf 1 Blatt mit Blüte**Anzucht:**

In Erdtöpfen oder Steinwollwürfeln

**Veredlung:**Möglich z.B. auf Unterlage „Snooker“ (SG) mit Korkwurzel-, Nematoden und Intermediärer Resistenz gegen *Phytophthora capsici*. Ertragsverbesserung in belasteten Böden (ca. + 20%) durch Versuche weitgehend belegt.**Aufleitung:**Bei extensiver Bodenkultur und Kurzkulturen mit 2,5 - 3 Pflanzen / m<sup>2</sup> am besten im arbeitssparenden, französischen Aufleitsystem mit 2 Schnüren in 3 bis 5 Etagen und Abstand haltenden, speziellen Clipsen, Pflanzung in Doppelreihen mit 0,50 x 0,50 x 1,00 m.

Die „Königsblüte(n)“ und die nächsten Folgeknospen sind beim Pflanzen zur Förderung des vegetativen Wachstums zu entfernen, ebenso verformte Früchte. Die ersten Früchte (2 – 3 Erntegänge) als Grünpflücke frühzeitig ernten. Nicht mehr als 8 – 10 Früchte am Leittrieb.

**Calciummangel:**

Das Risiko von Blütenendfäule und Fruchstippe läßt sich durch ausreichende Calciumbevorratung im Boden, Vermeidung von Versalzung, zu hohen Konzentrationen an Ammonium und Kalium im Wurzelbereich, Trockenheit, extremer Feuchtigkeit und zu hoher Luftfeuchte deutlich reduzieren. Mehrmalige Blattspritzungen mit Calciumchlorid oder Kalksalpeter (0,3 - 0,5 %ig) sind vorbeugend oder beim ersten Auftreten durchzuführen.

**Freilandanbau:**

Dieser Anbau kommt nur in wärmsten Lagen und für Direktvermarktung in Frage.

## Paprika, blockig, Gewächshaus: Sortenbeschreibung 2007, (*Capsicum annuum*)

Sorten		Züchter/ Lieferant/ Ökosaatgut	Fruchtform/ Fruchtwand	Fruchtfarbe bei ...		Geschmack	Früh- zeitigkeit	Empfohlener Pflanztermin	Resistenzen					
				Fruchtbildung	Abreife				TMV	CMV	PeMV	PVY	Phyth.	
<b>Haupt-Sorten:</b>														
<b>Bendigo</b>	F 1	EZ/EZ/Ö	blockig, dickwandig	dunkelgrün	rot	mild	sehr früh	01.05. bis 01.06.	0	-	-	-	-	-
<b>Bontempi</b>	F1	Ru/Ne/--	blockig, dickwandig	dunkelgrün	rot	mild	sehr früh	01.05. bis 01.06.	0	-	-	-	-	-
<b>Ferrari</b>	F 1	EZ/EZ/Ö	blockig	dunkelgrün	rot	mild	früh	20.02. bis 01.06.	2	-	-	-	-	-
<b>Magnifico</b>	F 1	SG/SG/--	blockig, dickwandig	dunkelgrün	rot	mild	früh	20.02. bis 01.05.	3	-	-	-	-	-
<b>Yecla</b>	F 1	SG/SG/--	blockig	dunkelgrün	rot	mild	sehr früh	20.02. bis 20.03.	1	-	-	-	-	-
<b>President</b>	F 1	EZ/EZ/--	blockig	hellgrün	orange	mild	mittelfrüh	01.05. bis 01.06.	2	-	-	-	-	-
<b>Rubato</b>	F 1	SG/SG/--	blockig, s. uniform	hellgrün	orange	mild	früh	20.02. bis 01.05.	2	-	-	-	-	-
<b>Fiesta</b>	F 1	EZ/EZ/--	blockig	hellgrün	gelb	mild	mittelfrüh	01.05. bis 01.06.	0	-	-	-	-	-
<b>Luteus</b>	F 1	EZ/EZ/Ö	blockig	hellgrün	gelb	mild	mittelfrüh	01.05. bis 01.06.	0	-	-	-	-	-
<b>Weitere aktuelle Sorten:</b>														
<b>Cartago</b>	F1	Ru/Ne/Ö	blockig, dickwandig	dunkelgrün	rot	mild	früh	01.05. bis 01.06.	2	-	-	-	-	-
<b>Goal</b>	F 1	Br/Se/--	blockig	dunkelgrün	rot	mild	mittelfrüh	20.02. bis 15.05.	3	-	-	-	-	-
<b>Solario</b>	F 1	Cl/NZ/--	blockig, dickwandig	dunkelgrün	rot	mild	früh	20.02. bis 20.03.	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Sprinter</b>	F 1	EZ/EZ/Ö	blockig	dunkelgrün	rot	mild	sehr früh	20.02. bis 20.03.	2	-	-	-	-	-
<b>Score</b>	F 1	Br/Se/--	blockig	glänzend grün	gelb	mild	mittelfrüh	20.02. bis 15.05.	1	-	-	-	-	-
<b>Sirtaki</b>	F 1	RZ/RZ/--	blockig	hellgrün	gelb	mild	mittelfrüh	20.02. bis 20.03.	0	-	-	-	-	-
<b>Lustro</b>	F 1	SG/SG/--	blockig, dickwandig	hellgrün	dunkelgelb	mild	mittelfrüh	01.05. bis 01.06.	-	-	-	-	-	-
<b>Mavras</b>	F 1	EZ/EZ/--	blockig	dunkelgrün	violett	mild	sehr früh	20.02. bis 20.03.	2	-	-	-	-	-

**Resistenzen:** CMV = Cucumber mosaic virus, TMV = Tobacco mosaic virus (3 Rassen), PeMV = Pepper Mottle Virus, PVY = Potato virus Y, Phyth. = Phytophthora capsici

**Modernes arbeitssparendes Aufleitsystem aus Frankreich und Spanien für Sommerkulturen im Kalthaus:**



Fotos: Queckbrunnerhof